

JAK SE VAKCÍNA COMIRNATY PODÁVÁ?

Vakcína bude aplikována vašemu dítěti injekčně do svalu na rameni v množství 0,2ml (10mcg tozinameranu). Nejdříve 3 týdny po první dávce je potřeba podat druhou dávku. Výjimku z tohoto pravidla tvoří těžce imunokompromitované děti, kdy je rozmezí mezi dávkami 4 týdny. Vakcína není t.č. zaměnitelná za jinou očkovací látku proti nemoci COVID-19. Při očkování druhé dávky byste u sebe měli mít záznam o předchozí aplikaci první dávky.

JAKÝ MŮŽE MÍT VAŠE DÍTĚ Z OČKOVÁNÍ PROSPĚCH?

V klinických studiích (Studie 3, děti 5-11 let) byla zjištěna vysoká účinnost (90 %) 7 dní po aplikaci 2. dávky vakcíny v prevenci onemocnění COVID-19 a vysoký titr neutralizačních protilátek měsíc po aplikaci vakcíny. Očkování ale neposkytuje všem očkovaným osobám záruku ochrany. Trvání ochrany v současnosti není známo. Po aplikaci 1. dávky vakcíny nejsou příjemci vakcíny plně chráněni a je třeba dodržovat běžné zásady ochrany proti nemoci COVID-19.

JAKÁ S SEBOU NESE OČKOVÁNÍ RIZIKA?

Během klinických studií byly ve skupině dětí 5-11 let zjištěny tyto nežádoucí účinky: bolest v místě aplikace injekce (> 80 %), únava (> 50 %), bolest hlavy (> 50 %), bolest hlavy (> 30 %), zarudnutí a otok v místě vpichu (> 20 %), bolesti svalů a zimnice (> 10 %).

S menší četností než 1:100 se vyskytovala po aplikaci vakcíny nevolnost, nespavost, malátnost.

Jsou popsány ojedinělé případy (méně než 1:1000 či frekvenci nelze z dostupných údajů určit) periferní parézy lícního nervu, myokarditidy nebo perikarditidy a anafylaktické reakce po podání vakcíny.

Někteří lidé mohou vzácně mít po podání očkovací látky alergickou reakci, která se nejčastěji projevuje jako svědivá vyrážka, problémy s dýcháním, otok obličeje nebo jazyka. V případě, že se u Vás taková alergická reakce vyskytne, neprodleně kontaktujte svého praktického lékaře nebo v mimopracovní dny navštivte pohotovostní lékařskou službu.

V případě ohrožení života a zdraví volejte Zdravotnickou záchrannou službu na telefonním čísle 155. Bez včasné pomoci lékaře může dojít k újmě na zdraví, ve výjimečném případě můžete být také ohrožen(a) na životě.

Vzácné nežádoucí účinky se v probíhajících studiích i rozsáhlých vakcinačních kampaních stále sledují.

JAK SNÍŽIT RIZIKO ZÁVAŽNÝCH NEŽÁDOUCÍCH REAKCÍ?

Po každém očkování je vyžadováno vyčkání ve zdravotnickém zařízení 15 minut po vakcinaci. V následných dnech po očkování se doporučuje dodržovat alespoň další 3 dny klidový režim. V případě rozvoje závažných potíží mimo zdravotnické zařízení volejte Zdravotnickou záchrannou službu na telefonním čísle 155.

Pročetl/a jsem, porozuměl/a jsem textu a měl/a jsem možnost klást dotazy. Prohlašuji, že nevím o žádném důvodu, který by mému dítěti bránil v aplikaci této očkovací látky a všechny mnou zadané údaje jsou pravdivé. Potvrzuji, že jsem byl/a seznámen/a s možnými vedlejšími účinky. Těmto informacím rozumím a nemám žádné otázky ani nejasnosti. Byl/a jsem poučen/a o způsobu aplikace vakcíny a povakcinačním režimu. Prohlašuji, že jsem byl/a informován/a beru na vědomí, že předpokládaného výsledku uvedeného zdravotního výkonu nemusí být dosaženo.

Souhlasím s provedením očkování.

Jméno a příjmení zákonného zástupce očkovaného

Podpis zákonného zástupce očkovaného:

Datum:

Podpis očkujícího zdravotníka:

Datum:

O provedeném očkování informujte praktického lékaře Vašeho dítěte!

Zde vyplní pracovník zařízení, kde bude vakcína podána:

#	Datum očkování	Sériové číslo/datum expirace	Místo vpichu (nehodící škrtnout)		Vakcínu podal (iniciály)
			P paže	L paže	
1.dávka			P paže	L paže	
2.dávka			P paže	L paže	